

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή περιεκτικότητα σε Mg και ιχνοστοιχεία.
- Βελτίωση της υγείας των φυτών και περιορισμός της επιπτώσης των φυσιολογικών καταπονήσεών τους.
- Αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες λόγω των επιφανειοδραστικών και προστατευτικών συστατικών που περιέχει.
- Συμβατότητα στο βυτίο με τα περισσότερα προϊόντα φυτοπροστασίας.
- Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:

- Το προϊόν πρέπει να προστίθεται στο βυτίο του ψεκαστικού συγχρόνως με το νερό και υπό συνεχή ανάδευση.
- Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εφαρμόστε με προσοχή τις οδηγίες και τις δόσεις του παρασκευαστή τους.
- Τα άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας της ανάμιξης και αν χρειάζεται προδiluμένα.
- Εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ		β/β	β/ο
Συνολικό άζωτο	N	3,6	5,4
Νιτρικό άζωτο	NH ₃ -N	3,2	4,8
Αμμωνιακό άζωτο	NH ₄ -N	0,2	0,3
Υδατοδιαλυτό Μαγνήσιο	MgO	12,0	18,3
Υδατοδιαλυτό Θειάφι	S	4,3	6,5
Υδατοδιαλυτό βόριο (ως άλας βορικού οξέος)	B	0,3	0,45
Υδατοδιαλυτό μαγγάνιο	Mn	1,0	1,5
Υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος	Zn	0,7	1,05
Άλλα συστατικά			
Αμινοξέα υδρόλυμένα		3,0	4,5
Χλωρίδια	Cl	5,2	7,8

ΒΙΟΦΟΛ Mg



ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Υδατικό αιώρημα Αζώτου και Μαγνησίου με ιχνοστοιχεία.

3.6 - 0 - 0 + 12 Mg + 4,3 S + ιχνοστοιχεία

Για διαφυλλικές εφαρμογές

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.
- Να φοράτε προστασία ματιών/προσώπου.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.
- Περιέχει θεικό μαγγάνιο μονοϋδρικό.



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1 λίτρο (1,5 κιλά)**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **ΒΙΟΦΟΛ Mg** είναι ένα ειδικό διαφυλλικό λίπασμα σε μορφή υδατικού αιωρήματος για την πρόληψη και τη θεραπεία των τροφολογικών Μαγνησίου σε όλες τις καλλιέργειες όπως: Αμπέλια - Σταφίδες (Ξίρανη της ράχης), Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Πατάτες, Κηπευτικά κ.λ.π.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Αμπέλι: 300-500cc /στρ. 2-3 εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή μετά την άνθιση, η δεύτερη κατά το κλείσιμο των τσαμπιών και η τρίτη, αν χρειαστεί, κατά την έναρξη της ωρίμανσης.

Εσπεριδοειδή: 200-400cc/στρ. 2-3 εφαρμογές. Η πρώτη πριν την άνθιση, η δεύτερη μετά την καρπόδεση και η τρίτη 2-3 εβδομάδες αργότερα.

Μηλοειδή: 300-500cc/στρ. 2-3 εφαρμογές. Η πρώτη γίνεται πριν την άνθιση, η δεύτερη όταν οι καρποί φτάσουν το μέγεθος καρδιού και η τρίτη, αν χρειαστεί, 2-3 εβδομάδες αργότερα.

Πυρηνόκαρπα: 300-500cc/στρ. 1 εφαρμογή μετά την άνθιση και επανάληψη ανά 15 ημέρες αν χρειάζεται.

Πατάτα: 300-500cc/στρ. 2-3 εφαρμογές. Η πρώτη γίνεται 2 εβδομάδες πριν την άνθιση, η δεύτερη κατά την άνθιση και η τρίτη 2 εβδομάδες αργότερα.

Τεύτλα: 300-500cc/στρ. 1 εφαρμογή στα 6-12 φύλλα.

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα: 200-400cc/στρ. 2-4 εφαρμογές. Η πρώτη γίνεται 1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση, η δεύτερη κατά την έναρξη της άνθισης και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες αν χρειάζεται.

Κολοκυνθοειδή: 300-500cc/στρ 3-4 εφαρμογές κάθε 2 εβδομάδες με έναρξη 2 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση.

Βαμβάκι: 200-400cc/στρ. 1-2 εφαρμογές κατά την ανάπτυξη και 1 εφαρμογή κατά την άνθιση, πριν το δέσιμο των καρδιών

Μηδική: 200-400cc/στρ. 1 εφαρμογή μετά από κάθε κοπή και όταν τα φυτά έχουν ύψος 10cm.

Φράουλα: 300-500cc/στρ. 1-3 εφαρμογές ανάλογα με την καλλιέργεια και 1 εφαρμογή πριν την ένταση του προβλήματος.

Λοιπές Καλλιέργειες: 200-500cc/στρ. 1-3 εφαρμογές ανάλογα με την καλλιέργεια και την ένταση του προβλήματος.

Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό με όγκο ψεκαστικού υγρού **100-150lt/στρ.**

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρασκευαστής: AGLUKON GERMANY

Διανομή: K&N EYΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ,

ΒΙ.ΠΕ.Ο., Τ.θ.48, 570 22, Σίνδος

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

