



EPPEKI 50 WG



Flonicamid (καθαρά ομάδα πυριθροακαρεοβιοφωσφίνης)

Εντομοκτόνο

Εγγραμμένη σύνθεση: Flonicamid 50% BR
Βοηθ. ουσίες 47,82% BR



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρά αθροιστικά ερεθίσματα.
- Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Να αποφύγετε τους εκσόνους για να επιβιώσουν όλα και να περιβάλλουν ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.

UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WKBW

ΕΦΥΛΙΣΣΑΤΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προσέτι μήναι να επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 75 γρ.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διευθυντής: K&N ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Σ. Τ.Β. 48, 570 22, Σόλωνας Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@entymedia.gr
Αριθ. Άδειας Διακίνησης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14511 / 29-5-2015

Κάτοχος της άδειας, παρασκευαστής εκσκευαστής: ISK BIO SCIENCES EUROPE N.V.

Pegasus Park, De Kleeflaan 12 b, Box 9 1831 Diegem, Βέλγιο



ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

“Φυλάσσεται κλειδωμένο. -Μην τρώει, πίνει ή καπνίζει όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. -Γιατί να γίνει θρονοκτομικό και πράσινο σχετικά με το χρώμα. -Να φοράτε προστατευτικά κατά προστατευτικά ενδύματα μέσα απομική προστασία για τα μαλλιά/πρόσωπο. -Ανάβω του περιεχομένου/περίεχη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. -Φοράτε γάντια, αλδοση προστατευτικό ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προστασία κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρμωσης. -Φοράτε αλδοση προστατευτικό ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. -Φοράτε γάντια και αλδοση προστατευτικό ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τράπεζι με καμπίνα. -Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προστασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τράπεζι χωρίς καμπίνα. -Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προστασία και αλδοση προστατευτικό ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με εκσόνους πλάτης ή αερό. -Φοράτε αλδοση προστατευτικό ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού γεωσκώου. -Σε περίπτωση επανάληψης στην καλλιέργεια φοράτε αλδοση προστατευτικό ενδυμασία.”

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η Η ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟΥ.

(Μην τρέχετε ή ρυπαίνετε εφαρμογές κατά σε επιρροακά ούδα. Να αποφευχθεί η ερπύστα με την συσσώρευση αποχετεύσεως από τις εκσόνους στα επιφανειακά νερά. Για να αποφευχθεί η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα/να οφείλεται μόνο εκμηικατό ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιρροακά ούδα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παροουσίας μελισσών.

Κατηγορία και όρος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά τον σπώον. Η δράση του εντομοκτόνου είναι επιλεκτική παρεμποδίζοντας τη διασυστηματική των αφίδων με αποστολή να είναι αποδοτική με εντομοκτόνα να τρέφονται και να περιβάλλον σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάστασης: Ζητείστε αμέλως ιατρική συμβουλή και δείξτε από το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το σπώον σε άλλο που έχει λάβει τις ασθιές. Σε περίπτωση παύσεως: Μεταφέρετε τον πώον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε σάβου που διακονούν την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΘΗΜΗΣ ΤΑ ΝΑΤΙΑ: Σπλίντετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν σκώα επόλης, αφαιρέστε τους εκσόνους ένα ένα. Στεγνώστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποστούν ο αθροισμής ερεθισμός, Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε κάποιον. Σε περίπτωση σπώου με το δέρμα: Σπλίντετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπαιε εκσόνωση ή ψεκαστικό νερό με άφθονο νερό υπό πίεση. Αφαραιρέστε αμέλως το ρώο από το σώμα όπως αλλοσημαία ή ψεκαστικό νερό. Πλώστε να την τώον με νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΦΑΝΗΡΙΑΣΣΑΣΤΕ: 210 73 93 77

Συνθήκες αποθηκευσεως: Χρονική σταθερότητα εκσκευαστικού: Το εκσκευαστικό παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική εφαρμογή με εκσκευαστικό, σε χώρο ήπιο, άφθροακά και καλά αεριζώμενο.



HMMA ΠΑΡΑΡΘΗΓΕΑΡ ΠΑΡΤΙΑΣΣΕ: Βλέπε φύλλα

ΕΣΠΕΡΙΔΟΙΔΗ: Πορτοκαλιές, Μανταρινιές, Λεμονιές, Γκρέϊτ – φρούτ, Κίτριά, Φράπτες, Νερανθίες, Περγανώνας. **Για αφίδες ετεροπώδων:** (*Aphis citricola*, *Toxoptera auranti*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 3,5-10γρ/100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ: Ροδιανάκιες: **Για αφίδες** (*Myzus persicae*, *Hyaloperilus pruni*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ/100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Κερασιές: **Για αφίδες** (*Myzus persicae*, *Myzus persicae*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzi*, *Hyaloperilus pruni*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ/100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Δασοσκώα: **Για αφίδες** (*Hyaloperilus pruni*, *Myzus persicae*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ/100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

ΜΗΛΙΕΣ: **Για κίτριά αφίδα** (*Dysaphis abietum*, *Dysaphis pruni*, *Ericospiza lanigerum*) και **για πράσινη αφίδα** (*Aphis pomi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ/100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Ουκας κεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΒΑΜΒΑΚΙ: **Για αφίδες** (*Aphis gossypii*) και **για Λύγκο** (*Lycus sp./?*) (Χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 7,5γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

ΑΡΑΚΙΣ (ή **λοβός** ¹⁰): **Για αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis fabae*) (Χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το σπώον του β' ζεξιμικού φύλλου χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 35-70 γρ./100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Ουκας κεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΚΑΛΑΜΠΟΤΙΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ (αγρού και θερμοκηπίου): **Για αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών εντόμου. ¹¹ Ίδραιστε στο θερμοκήπιο από το 5% των φύλλων έχει προβλήσει από 1 ή περισσότερο εντόμου. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

ΚΑΛΑΜΠΟΤΙΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ: **Για αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

- 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
- 2) Σε περίπτωση που υψηλό ποσοστό προσβολής ακολουθείται πρόγραμμα γεωσκώου το οποίο να προβλέπει εναντίωση προϊόντων διαφορετικού τρόπου δράσης.

μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ/100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

ΑΧΙΔΑΙΕΣ, ΚΥΔΩΝΙΕΣ, ΝΑΣΗ: **Για αφίδες κίτριά αφίδα της αχιδάδας** (*Dysaphis pruni*, *Ericospiza lanigerum*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ/100 λίτρα κεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

ΣΟΛΑΝΟΙΔ: **Τομάτες, Μελάντρες (αγρού):** **Για αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτες, Μελάντρες (θερμοκηπίου): **Για αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ¹² Ίδραιστε στο θερμοκήπιο από το 5% των φύλλων έχει προβλήσει από 1 ή περισσότερα εντόμα. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 φυλλοσκώου, 2 Μεγάλην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτες, Μελάντρες (θερμοκηπίου) (για εφαρμογές με στάγθνη άρδευσης): **Για Αλεγειριές** (*Bettibia labialis*, *Triaenodes variegatorum*). Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση η άρδευση εφαρμογών είναι max 3 με δύο πετρώδες στάγθνη άρδευση και μία φυλλοσκώου. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 max (1 φυλλοσκώου, 2 Μεγάλην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 μέρες εφόσον απαιτείται. Ουκας κεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος εφαρμογής:

Καλλιέργειες φυλλοσκώου: Καλλιέργειες φυλλοσκώου.

Τρόπος παρασκευαστικού γεωσκώου: Γεμίζουμε το δοχείο του γεωσκώου μηχανήματος με νερό ή μεσο. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του γεωσκώου αναδευόμενος. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας ανάδευση.

Καθαρισμός γεωσκώου μηχανήματος: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. **Καθαρισμός γεωσκώου:** Αδειάζετε τελείως το γεωσκώο βύλο. Βασιλευθείτε όχι έχουν απομικροβιακή άα ή την του εκσκευαστικού ζεπλύνετε το βυθό και τα εξαρτήματα του γεωσκώου με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίηση ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωσκώου, φυτοεισής ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το εκσκευαστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Εφαρμογή πρακτικού ολοκληρωμένου διαχείρισης και προστασίας των φυλλών αφρόπώδων, ώστε να περιοριστούν οι επιβλαβείς

στις απολλώεις αποπάρτεες. -Επιμεθάδες με ΤΕΡΡΕΚΙ ναρό, όταν ο πληθώσμος των αφίδων είναι σε υψηλό επίπεδο. -Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιάστημα και δεν έχει γίνει έλλογος ή ενδοχρημής άρδευση. -Επιμεθάδες από τη χρήση του εκσκευαστικού. ¹³ Για τις χρήσεις εντόμο, ο κάτοχος της άδειας δεν έχει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη αποτελεσματικότητα από τη χρήση του εκσκευαστικού. ¹⁴ Για τη χρήση ήσσονος σημασίας του Αρακά (με λοβό), δεν έχει τεκμηριωθεί ή αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλλογος για ενδοχρημής αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του εκσκευαστικού. Για την χρήση του εκσκευαστικού ο κάτοχος της άδειας δεν έχει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του εκσκευαστικού.

Τρόπος εφαρμογής: γεωσκώου: Καλλιέργειες φυλλοσκώου.

Τρόπος παρασκευαστικού γεωσκώου: Γεμίζουμε το δοχείο του γεωσκώου μηχανήματος με νερό ή μεσο. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του γεωσκώου αναδευόμενος. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας ανάδευση.

Καθαρισμός γεωσκώου μηχανήματος: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. **Καθαρισμός γεωσκώου:** Αδειάζετε τελείως το γεωσκώο βύλο. Βασιλευθείτε όχι έχουν απομικροβιακή άα ή την του εκσκευαστικού ζεπλύνετε το βυθό και τα εξαρτήματα του γεωσκώου με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίηση ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωσκώου, φυτοεισής ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το εκσκευαστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Εφαρμογή πρακτικού ολοκληρωμένου διαχείρισης και προστασίας των φυλλών αφρόπώδων, ώστε να περιοριστούν οι επιβλαβείς

στις απολλώεις αποπάρτεες. -Επιμεθάδες με ΤΕΡΡΕΚΙ ναρό, όταν ο πληθώσμος των αφίδων είναι σε υψηλό επίπεδο. -Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιάστημα και δεν έχει γίνει έλλογος ή ενδοχρημής άρδευση. -Επιμεθάδες από τη χρήση του εκσκευαστικού. ¹³ Για τις χρήσεις εντόμο, ο κάτοχος της άδειας δεν έχει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη αποτελεσματικότητα από τη χρήση του εκσκευαστικού. ¹⁴ Για τη χρήση ήσσονος σημασίας του Αρακά (με λοβό), δεν έχει τεκμηριωθεί ή αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλλογος για ενδοχρημής αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του εκσκευαστικού. Για την χρήση του εκσκευαστικού ο κάτοχος της άδειας δεν έχει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του εκσκευαστικού.