

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Αποφύγετε να αναπνεύετε σκόνη/ αναθυμώσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Να αποφεύγετε τη λευθέρωση στο περιβάλλον. • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Να διατηρείται ο περιεκτικός ερμητικά κλειστός. • Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμά ή τα κενά της συσκευασίας του.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.

Γιατροί: Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

UFI: 9NE2-50C4-S004-MR3H

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιαστές μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν (η εφαρμογή να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Δύο (2) χρόνια στην αρχική του, καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.



Ημ/νία παρασκευής: βλέπε φύλλο
Αριθμός παρτίδας:



THERBONAL

28,75 EC

etofenprox (ετοφενπρόξ)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση: etofenprox 28,75% β/ο
βοηθ. ουσίες 69,29% β/β

UFI: 9NE2-50C4-S004-MR3H

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρή/τόξη δέρματος ή σκίαση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ.

Παρασκευαστής:

Mitsui Chemicals Crops & Life Solutions, Inc.



Mitsui Chemicals


Ιαπωνία

Κάτοχος της άδειας - Διανομέας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδός

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14327 / 16-3-2009



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη εστερικό πυρεθροειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομαχού. Δρά στο νευρικό σύστημα του εντόμου-στόχου και συγκεκριμένα στη ραή των ιόντων νατρίου στις μεμβράνες των νευρικών αξόνων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ: Για Καρπόκαφη (*Cydia pomonella*) στη δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Για Φυλλοδέττη (*Adoxophyes orana*) στη δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Ευθεμίδα (*Lobesia botrana*) στη δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΛΑΧΑΝΟ: Για Περιόδη (*Pieris brassicae*) στη δόση 50 κ.εκ./στρέμμα, με 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-14 ημέρες. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων, στις περιοχές που εφαρμόζονται.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (Γ'): Για Μετκάλη (*Melcalpha pruinosa*) στη δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμός Φυλλώματος. Να διενεργείται μια εφαρμογή με την εμφάνιση των επιβαρικών εντόμων κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας των ενηλικών του *Melcalpha pruinosa* καθώς και του παρασιτοειδούς *Neodyrinus typhlocybae* όπου έχει εγκατασταθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

(*)**Παρατήρηση:** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην «μικρή σμιασία» καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την προαναφερθείσα χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απιστηίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με THERBONAL 28,75 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

-Μηλιά, Ροδακινιά, Λάχανο: 7 ημέρες -Αμπέλι: 14 ημέρες -Ακτινίδιο: Μη εφαρμοζόμενο